



## Csonthéjas-kilátások Dél-Európában

Az előző évvel ellentétben ebben a régióban idén nagyobb fagykárokra számítanak, a kajszis és a nektarin esetében akár 50-60%-os, míg a lapos és a hagyományos őszibarackból egyes helyeken 30-40%-os kiesés várható. Mivel a cseresznyefákon a termés már fejlettebb, azokon körülbelül 20%-kal csökken a termés. Olaszországban mindenhol nagyon ígéretesen fejlődnek a gyümölcsök. A néhány hideg éjszaka ellenére szó sincs komolyabb veszteségről, ezért sikeres szezonot feltételeznek.



A jelenlegi becslések szerint az első korai nektarin- és őszibarackfajtákat már a 19. héttől szedik, Észak-Olaszországban azonban legkorábban június végén kezdik a szüretet.

Jelenleg ebben a térségben kedvezőtlen fordulatot vehet az időjárás, ám az előrejelzések szerint fagy nem lesz. A cégcsoport érdekeltségei közül a görögországi Tyrnavos és Imathia régiójában általában a nektarint kezdik el először szüretelni, majd június közepétől folytatják az őszibarack betakarításával.

A világpolitikai helyzet hatásai a csonthéjasok termesztésében is érezhetőek lesznek, véli a Kölla

## Csonthéjas-kilátások Dél-Európában

Közzétéve itt: [magyarmezogazdasag.hu](https://magyarmezogazdasag.hu) az Agrárhírportál (<https://magyarmezogazdasag.hu>)

---

csoport egyik vezetője. Az óriási költségnövekedés az ellátási lánc minden szereplőjét sújtja, magasabb termelési és logisztikai költségekkel kell számolni, ugyanakkor a jó mennyiségi kilátások miatt derűlátóan tekintenek az idei szezorra.

**Szerző:** Kertészet és Szőlészet/freshplaza.de

**Közzététel ideje:** 2022. 04. 22., péntek, 15:06

**A forrás webcíme:** <https://magyarmezogazdasag.hu/2022/04/22/csonthejas-kilatasok-del-europaban>